

BIOMEDICAL INFORMATION NOW AVAILABLE ON CD-ROM

TAKE A LOOK FOR YOURSELF



EXCERPTA MEDICA CD SERIES

- Anesthesiology
- Cardiology
- Drugs & Pharmacology
- Gastroenterology
- Immunology & Aids
- Neurosciences
- Obstetrics & Gynecology
- Pathology
- Psychiatry
- Radiology & Nuclear Medicine

Full Text: Meyler's Side Effects of Drugs/Sedbase

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT ONE OF THE FOLLOWING EXCERPTA MEDICA OFFICES:

(Europe) Tel: +31-20- 5803230, fax: +31-20-5803222 (U.S.A.) Tel: 800-HLP-EMED; 212-6333971, fax: 212-6333913
(Japan) Tel: 03-59911337, fax: 03-35940539,

or send your request to:

Exccerpta Medica, P.O. Box 548, 1000 AM Amsterdam, The Netherlands.

La voie de l'apaisement

FORME ET PRÉSENTATION: Comprimés adultes sécables (blancs): boîte de 20. **COMPOSITION:** complexe de synthèse de formule par comprimé: fébarbamate (DCI): 150 mg; difébarbamate (DCI): 105 mg; phénobarbital (DCI): 45 mg. Complexe de synthèse de formule par boîte: fébarbamate (DCI): 3 g; difébarbamate (DCI): 2,1 g; phénobarbital (DCI): 0,9 g. Excipient: silice colloïdale, lactose, amidon, talc, stéarate de magnésium. **PROPRIÉTÉS:** Aux doses habituellement utilisées en clinique, ATRIUM 300 se comporte comme: - un tranquillisant sans effet hypnotique, - un anxiolytique, - un antitétanique. **INDICATIONS:** - Troubles liés à l'abus et/ou à la dépendance alcoolique: anxiété, tremblements, sevrage, post-sevrage, tremblements à l'exception de ceux des parkinsoniens. **CONTRE-INDICATIONS:** État de choc, myasthénie, grandes insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques ou respiratoires, porphyries. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:** - L'absorption d'alcool pendant le traitement est formellement déconseillée. - **GROSSESSE:** en l'absence d'étude chez l'animal et de données cliniques humaines, le risque n'est pas connu; par conséquent par mesure de prudence, ne pas prescrire pendant la grossesse. **VIGILANCE ET CONDUITE:** L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de

ATRIUM® 300

véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnoler attachés à l'emploi de ce médicament. **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:** Atrium peut, par induction enzymatique: - accroître la dégradation hépatique de certains médicaments et entraîner une perte de leur activité (ex. antivitamines K, contraceptifs oraux: ne pas utiliser les dosages à 30 microgrammes d'œstrogènes); - accroître la quantité de métabolites hépatotoxiques de l'isoniazide. **EFFETS INDÉSIRABLES:** - Sédation constante en début de traitement qui disparaît en quelques jours. D'exceptionnelles arthralgies ont été signalées en traitement continu. De rares phénomènes allergiques ont été constatés. **MODE D'EMPLOI:** - **POSOLOGIE:** Voie orale: en moyenne 2 à 4 comprimés par jour pendant 2 à 4 semaines, à renouveler aussi longtemps que jugé nécessaire. Coût du traitement journalier: 4,29 à 8,58 F. Durée de stabilité: 5 ans. **SURDOSAGE:** Intoxication aiguë: somnolence pouvant évoluer vers le coma. - Traitement: diurèse osmotique. **LISTE II (TABLEAU C) A.M.M.: 311 679.5 (1971) Mis sur le marché en 1971. PRIX: 42,90 F (20 comprimés) Remb. Séc. Soc. à 70%. Collect. RIOM LABORATOIRES - CERM route de Marsat - 63203 RIOU-MONTAIGNE CEDEX Tél. (16) 73 38 07 35**